

傳氏眼科審視瑤函

眼科審視瑤函方目

卷之五目錄

瞻視昏渺症

明目地黃丸 龜鹿二氣膏 三仁五子丸

地黃丸 洞見碧宵 又方

睛黃視渺症

葛花解毒飲

乾澀昏花症

四物五子丸 黃牛膽煎 又方

坐起生花症

加減駐景丸 止痛散 摩頂膏

雲霧移睛症

猪苓散 蕤仁丸 摩頂膏 羚羊羌活湯

治眼花見物法

螢星滿目症

滋陰降火湯 加味坎離丸

神光自現症

補水寧神湯

黑夜睛明症

加減八味丸

視正反斜症

補陽湯 連藥益陰丸 升陽瀉陰湯

視定反動症

鉤藤散

視物顛倒症

羚羊角散

視一爲二症

補肝散

視赤如白症

復明湯

瞳神散大症

羌活退翳丸

滋腎湯

調氣湯

清痰飲

瞳神縮小症

清腎抑陽丸

能遠怯近症

地芝丸

六味地黃丸

能近怯遠症

定志丸

補腎磁石丸

神水將枯症

滋腎丸

補腎丸

調氣益氣湯

聚開障症

生熟地黃丸

棗花障症

羚羊角飲子

圓翳障症

空青丸 羚羊角飲子

水晶障翳症

七寶丸

剗脊翳症

七寶湯

魚鱗障症

羚羊角散

暴盲症

加味逍遙飲 桑胡參朮湯 熊膽丸 獨參湯

青盲症

鎮肝明目羊肝丸 復明丸 艾方 木事方

高風障症

人參補胃湯 積寧益氣湯 轉光丸 還明散

青風障症

羚羊角湯

綠風障症

半夏羚羊角散
羚羊角散

烏風障症

白附子湯
涼膽丸

偃月障症

補肝散
墜翳丸

如銀障症

石決明散

瞳神欹側症

生犀角丸

腦神返盲症

鎮心丸

還睛丸

還睛丸

退氣散血飲

傅氏眼科審視瑤函卷之五

秣陵傅仁宇九科纂輯

珩張文凱廷獻叅閱

廣陵林長生聲震較補

男傅維藩國棟編集

甥張秀徵珩訂正

公猷

掄

大梁周靖公亮節較梓

體仁

額

全次

運氣原證

按內經原氣所乘風燥火侵或水復金弱木侮所勝民病
目昏大要有四。一曰風熱經曰少陰司天之政風熱參
布雲物沸騰太陰橫流寒乃時至往復之作民病聾瞶
此風熱參布目昏也。二曰熱經云少陰在泉熱淫所勝

病目眩。治以鹹寒。此熱勝目昏也。三曰風經云。歲水不及。濕乃大行。復則大風暴發。目視眈眈。此風勝目昏也。四曰燥經云。陽明司天。燥淫所勝。目昧眇傷。治以苦熱。

是也。

目昏

經云。腎足少陰之脈。動則病生。目眈眈如無所見。又云。少陰病。目眈眈。無所見者。陰內奪。故目眈眈。

無所見也。此蓋房勞目昏也。左腎陰虛。右腎陽虛。劉河間曰。目昧不明。熱也。然左府者。無物不有。人之臟腑。皮毛肌肉。筋膜骨髓。爪牙。至於世人萬物。盡皆身意神識。能為用者。皆升降出入之通利也。有所閉塞者。不能為用也。目無所見。耳無所聞。鼻不知臭。舌不知味。筋痿骨痺。爪退齒腐。毛髮墮落。皮膚不仁。腸胃不能滲洩者。悉由熱氣怫鬱。玄府閉塞。而致氣滯。而為病之重。輕故知熱鬱於目。則無所見也。故曰。

昏者雖至近轉難辨物由目之玄府閉塞如隔簾視
物之象也或視如蠅翼者玄府有所閉塞者也或目
昏而見黑花者由熱氣甚而發之於目元則害承乃
制而反出其淚泣氣液瞇之以其至近故雖微而亦
見如黑花也○婁全善曰誠哉河間斯言也曰盲耳
聾身不聞臭舌不知味手足不能運用者皆由玄府
閉塞而神氣出入升降之道路不通故也故先賢治
目昏花如羊肝丸用羊肝引黃連等藥入肝解肝中
諸鬱蒸肝主目肝中鬱解則目之玄府通利而明矣
故黃連之類解鬱熱也椒目之類解濕熱也芫薺之
類解氣鬱也芎歸之類解血鬱也木賊之類解精鬱
也羌活之類解經鬱也磁石之類收飲真氣精華歸
明于目也蔓菁下氣通中理亦同也凡此諸劑皆治
氣血鬱結目昏之法而河間之言信不誣矣至於東
垣丹絲治目昏用參耆補血氣亦能明目又必有說
通之蓋曰主氣血盛則玄府得通利出入升降而明
虛則玄府不能出入升降而昏此則必用
參耆四物湯等劑助氣血運行而明也

瞻視昏渺症

視瞻昏渺有多端。血少神勞與損元。若是人年過五十。要明須是覓仙丹。曾經病目後昏渺各尋緣。

此症謂目內外無症候。但自視昏渺。朦朧不清。也有神勞有血少。有元氣弱。有精虧而昏渺者。若人年五十以外而昏者。雖治不得。明其時猶月之過望。天眞日衰。自然目光漸衰。不知元氣衰之極。雖妙藥難回。故曰不復愈矣。此章專言老人之昏。凡若因口病昏渺之比。各有緣故。須當分別。因口病而昏者。由障遮之故。欲成內障而昏者。細察其色。若有障治愈後而昏者。因障遮久。帶其色。若不早治。耗其

本而光白發有因目病漸發漸生痛損經絡血液澀少故光華虧耗而昏有因目病失治其內寒熱過傷及開導鍼烙炮熨失當而損因傷其血氣耗其精華而昏者以此皆宜培養根本乘其初時而治之久則氣脉定雖治不愈若目因痛而昏暗者此因氣滯火壅絡不和暢而光澀譬之烟不得透徹故火光不明如目暴痛愈後尚昏者血未充足氣未和暢也宜慎養以免後患若目病久愈而昏渺不醒者必因六慾七情五味四氣瞻視哭泣等故有傷目中氣血精液脉絡也宜早調治若人未五十目又無痛赤內障之病及斲喪精元之因而昏

渺無精彩者。其人不可。凡人年在精強。而多喪其元真。或苦思勞形。縱味久。思慮多。哭泣。婦女經產。損血。兩目內外。別無症候。但覺。花月復月。而年復年。漸。昏渺者。非青盲。即內障也。宜服。

明

目地黄丸

治腎虛目暗不明

熟地黃

四兩

生地黄

酒洗

山藥

澤瀉

山藥

酒洗

牡丹皮

酒洗

胡

決明子

乳蒸

當歸身

酒洗

五味子

酒洗

右為細末。煉蜜為丸。如。子。大。每服三錢。溫酒下。

送下忌蘿蔔。

精生氣。氣生神。故腎。

一虛則陽光獨治。陽光獨治。則。

壯火食氣無以生神令人目暗不明王冰曰壯水之主
以制陽光故用生熟地黃山萸五味當歸丹皮澤瀉味
厚之屬以滋陰養腎滋陰則火自降養腎則精自生用
山藥者所以益脾而培萬物之母。養神者所以養神而
生明照之精柴胡者所以升陽而發神明之氣於精明
之竅也。孫思邈曰。中年之後。有目疾者。宜補不宜瀉。可
謂開萬世之朦矣。

仙膏此膏最治虛損夢泄遺精瘦削少氣目
視不明等症。久服大補精氣益氣養神。

鹿角一斤 龜板一斤 枸杞子六兩 人參三兩

右將鹿角截碎。龜板打碎。長流水浸三日。刮去垢。入砂

鍋用河水慢火魚眼湯桑柴煮三晝夜不可斷火留添滾水不可添冷水至三斗取出晒乾碾爲末另用河水將末并枸杞人參又煮一晝夜濾去滓再慢火熬成膏初服一錢五分漸加至三錢空心無灰酒化下

精氣神人身之三寶也經曰精生氣氣生神是以精損極則無以生氣以致瘦削少氣氣少則無以生神以致目昏不明鹿得天地之陽氣最全壽延任脈是於精者故能多淫而壽龜得天地之陰氣最厚壽延任脈是於氣者故能伏息而壽若夫二物聚精氣神之最勝者取而爲膏以利之於神補以類也且二物氣血之

屬非草木藥之可比。况又得造化之玄微。異類有情。以血氣而補血氣之法也。人參為陽。補氣中之怯。枸杞為陰。清神中之火。是腎也。補陰補陽。無偏治之失。入氣入血。有和平之美。由是精日生而氣日旺。氣日旺而神日

三仁五子丸 治肝腎不足。體弱眼花。

栢子仁 酒蒸 肉苁蓉 酒浸 苧前 酒浸 以仁 酸棗仁 去殼炒

杞枸杞 酒蒸 兎絲 酒煮 當歸 酒洗 覆盆子 酒蒸 沉香 五錢

白茯苓 乳拌蒸。晒 五味子 焙 熟地黃 三兩。酒水煮

右除沉香未熟。地黃另入。餘為細末。煉蜜為丸。如桐子

大每服五十九至心青鹽湯送下即白滾湯亦可

地黃丸一名補花丸。治用勞心肝虛風熱致眼赤腫

視傷血而主用故動書則傷肝而目昏肝傷則米生

風而熱氣上攻目昏牙痛不宜專服補藥當益血鎮

熟地黃半兩 防風 川羌活 桂心 白菊花

沒藥 明礬砂各五錢 煅明子一名

右為細末煉蜜為丸每服三錢食後湯送

下每日三次

洞見碧霄此應驚風眼 經然載諸統

用鹿服一對沃乾為末以人乳汁再研母以

夜寐

坐起生花症

坐起生花不必疑君心仔細自尋思。外出竭視勞瞻故內
爲荒淫酒色迷。元氣弱。絡力微。眼花頭暈強支持。若能保
養真元。永勝似千金。訪妙醫。

此症內外別無他症。但其人動作少過。坐起少頻。或久
坐或久立久眠久視。便覺頭眩目花昏運也。乃元氣怯
弱。陰精虧損。致水少液枯。脈絡衰疲之咎。惟陰弱陽虛
水不勝火。每有此患。宜服

加減駐景丸。治用腎氣虛。視物恍惚。血少氣多。瞳人內有

清視瞻翳。

卷之五

八

血氣虛耗。

車前子炒 枸杞 五味子各三兩 當歸去尾 熟地黃各五兩

川椒去核 葶子晒乾無翳者 兎絲子水淘淨酒煮

石礪末蜜水煮糊為丸如桐子大每服三十丸空心

溫酒送下鹽湯亦可。

止痛散治兩額角痛 疔見黑芷及日赤

瓜蒌根二兩 柴胡半斤 黃芩二兩

生地黃各四兩 黃芩二兩 黃芩二兩

右為籠末每服三錢酒下三片棗一枚煎去滓。

臨睡熱服若小便不利者酒下各五錢。

摩頂膏

治川腎虛風上攻兩目
眼視生翳花或如水淚

空青

研

青鹽

研各五錢

槐子

白附子

炮

木香

鵝脂

四兩

旱蓮草

取自然汁一升

丹砂

研二錢半

龍腦

五錢

石為細末先以旱蓮草汁牛酥鵝脂入銀器或銅器鍋

中熬至三五沸再下諸藥末煎減一半即傾入磁器內

盛之臨卧用舊銹鐵一片重二三兩蘸藥於頂上摩

三十遍令入髮竅中次服駐景丸忌鐵鍋

雲霧移睛症

雲霧移睛元虛者殃白視目外有物舒張或如蠅蛇飛伏

或如旌旗飄揚有如粉蝶有帶青黃昏屬腎肝內障難當

審視瑤函

卷之五

九

真氣耗損精汁有傷。自宜謹慎思患須防。

此症謂人自見目外。有如蠅蛇。旗旆。峽蝶。絲環等狀。其
物色或青黑粉白微黃者。在於眼外。空中飛揚。繚亂如
視則上俯視則下也。乃玄府有傷。絡間精液耗瀝。鬱滯
精純之氣而爲內障之患。其源皆屬肝腎自病。白者因
痰火肺金清純之氣。黃者脾胃清純之氣有傷。蓋
瞳神乃先天之元陽。五臟聚五臟之精華。因其內損
故有其狀。虛弱不足。及經流去血太多。或悲泣太
過。深思積忿之婦女。每有此病。小兒疳積。驚風。及癰痰
傷寒熱久。致目痛久閉。蒸傷精純之氣。亦有此患。幼兒

無知至長始曉氣絡已定治亦不愈宜服摩。

猪苓散

治腎弱不能濟肝用生虛熱勝生肝候肝木枯勝氣不足故行動舉其則脾內神水蕩流有黑影如肝腎之邪次服猪苓仁丸黑花白消矣。

木猪苓

木通

扁蓄

蒼朮

泔水製

黑狗脊

大黃

滑石

飛過

梔仁

各一兩

車前子

酒蒸過五錢

右為細末每服三錢空心青鹽湯調下

猪仁丸

治眼黑花飛蛇翳痛昏暗漸變青盲

猪仁

去皮

地膚子

白茯苓

細辛

人參

洗淨

地骨皮

白朮

炒各一兩

石膽

易研五錢

熟地黃

各三

空青

另研防風

各一兩

青羊膽

一枚

鯉魚膽

得此藥時

卷之五

十一

右為細末。研勻。以膽汁同蜜煉。搜和為丸。如桐子大。每

服三三錢。食後米飲送下。

摩頂膏 治眼前見花黃

白附子 炮去 木香 五錢 青鹽 一兩

明珠砂 二錢 牛酥 二兩 脂 四兩

右將前藥末同酥脂 火熬成膏 候用少許不拘時

頂上摩之。

羚羊羌活湯 治肝腎俱虛 見

黃芪 兩 參 兩 甘草 兩 羚羊 兩 羌活 兩 黃芩 兩

山慈肉 一兩 附子 兩 黃柏 兩 黃芩 兩

决明子微 澤瀉 秦艽上 柴胡法 各兩半

白薇未 每服五錢 水二鍾 煎至八分 去滓 不拘時 溫服

治眼花見物法

有患心疾見物皆如獅子形。伊川教之。若見其形。即以手向前捕執之。見其無物。以疑疾去。遂愈。

螢星滿目症

兩目螢星亂散。六陽微火。上炎。致肺光不滅。清心寡慾。當先。

此症謂人自視目外有無數細細星如螢火飛綴亂也。甚則如燈光掃星矣。其人以必耽酒嗜燥。夢心竭腎疲。

火上升。目絡。凝滯。精汁為大賊之邪火。薰蒸所損。故陽
光散亂。而飛伏乃水不勝火之趣。此病之最重者。久而
不治。內障成矣。宜服。

滋陰降火湯

治陰虛火動。起於九
泉。此補法之劑也。

當歸

錢

川芎

五

生地黃

黃

熟地黃

黃

同麥冬

肉

白芍藥

汁

黃芩

柴胡

各

甘草

右剉剉

拍水

二

煎至

八

分

去滓

按此劑乃滋腎益陰

并水降火之聖藥

并治咳嗽

加阿

膠

杏仁

各

五

味

子

○略

唾

血

加牡丹皮

分

藕

節

○若

加

玄

明

頻用之童便亦好

加味坎離丸

此丸能生津益血升水降火清心明目蓋此

大。火。症。而。取。効。速。王。道。之。藥。無。出。於。此。上。盛。下。虛。之。人。服。之。極。効。

懷慶熟地黃

八兩。一。半。用。砂。仁。一。兩。以。絹。袋。盛。放。砂。確。

茯苓二兩。研末。如前用酒二碗。煮乾。去。砂。仁。不。用。一。半。用。白。

甘州枸杞子

揀去梗。當歸全用。好酒浸一。

白芍藥

好酒浸一日。

川芎

大而白者洗淨。

女真實

即冬青子。冬至日採。蜜水。

甘菊花

去梗葉。家園者佳。野菊。

厚川黃蘗

去粗皮淨。切片。八兩。二兩酒浸。二兩鹽水浸。

色。口去皮切片

知母去皮切片六兩分作四分如黃蘗四製同

除地黃膏另入餘八味脩製如法合和一處鋪開日晒
夜露二晝夜取天地之精日月之華再爲細末煉蜜爲
丸如梧桐子大每服八九十九空心白滾湯送下或青
鹽湯亦可並忌蘿蔔生冷

安見

見靈樞大惑論帝曰予嘗上清冷之臺中階而顧前
定氣久而不解獨博獨眩披髮長跪悅而視之良久
而不已也幸然自止何氣使然哉伯曰五臟六腑之
精氣皆注於目而爲之精精之爲目五臟六腑之
子筋之精爲黑眼血之精爲絡其氣之精爲白膜
肌肉之精爲約束裏筋骨之精爲氣之精爲白膜
系上屬於腦後出於項中於項因逢身之虛
其入深則隨眼系以入於腦入於腦則腦轉腦轉則
引目系急目系急則目眩以轉矣邪中其精其精所

十不相比也。則精散。精散則視岐。故見兩物。一又云。自者五臟六腑之精也。榮衛氣魄之常營也。而神氣之所生也。故神勞則魂散。志意亂。是故瞳子黑睛法於陰。白睛赤脈法於陽也。故陰陽令轉而睛明也。目者心之使也。心者神之舍也。故神精亂而不轉。卒然見非常。處精神魂魄散不相得。故曰夢也。帝曰。子疑其然乎。每之東苑。未會不感。夫之則復。子唯獨爲東苑勞神乎。何其異也。岐伯曰。不然也。心有所喜。神有所惡。卒然相感。則精氣亂。視誤故惑。神移乃復是故聞者爲迷。甚者爲惑。素問云。睛明者。所以視萬物。別白黑。審長短。以長爲短。以白爲黑。顛倒錯亂。神光暗曜。則精衰而視變矣。宜分虛實治之可也。

神光自現症

神光人自見。起初如閃電。陰精消絕。陽陽光欲飛變。惟見一片茫。何用望。哀怨。

此症謂目外自見神光出現。每如電光閃掣。甚則如火。

微霞明。蓋時發時止。與瞻視有色之定者不同。乃陰精
虧損。清氣拂鬱。立府太傷。孤陽飛越。而光欲散。內障之
重者。非比螢星痰火之輕也。宜服。

補水寧神湯

補腎水。則火不妄動。
寧心神。則光自消除。

熟地黃

生地各二錢 白芍藥

當歸

麥門冬

去心

扶神

各錢半

五味子

三十粒

甘草

用生六分

右剉剉。白朮二鍾煎至八分。去滓。空心溫服。

腎水虧虛。真陰不足。故用熟地黃。乃天一生水之劑。大

補真陰。生地黃有滋陰退熱之効。麥門冬有清心降火

之功。補血滋陰。須憑當歸。白芍神光。夢寐晝夜不寧。此

神思間無形之火妄動故也。必用茯神與五味子養精安神定志。能斂元精之氣。不走散。生甘草降神中之火。八味共建厥功。庶幾腎水上升。心火下降。而神自寧。光亦可定矣。

黑夜睛明症

黑暗之間。倏忽見物。莫道精神虧損。將出此陽光欲墜之機。而水火背違之疾。若不關心。定應有失。

按此症。人體天地之陰陽。晝明夜晦。理之自然。今黑暗間開目。倏忽看見者。是背於陰陽也。必水火不交。精華關格乖亂。不和之甚。而陽光飛越。精氣不能攝養。陰虛

而陽光無制矣。反曰：精華聚盛而不為慮，往往羅害，遺悔非小也。宜服。

加減八味丸 治腎水不足，虛火上炎，以致目之神光失序。或牙齦潰爛，咽喉作痛，或形體憔悴，寢汗發熱，五臟齊損，火拒上焦等症。

或牙齦潰爛，咽喉作痛，或形體憔悴，寢汗發熱，五臟齊損，火拒上焦等症。

熟地黃 八兩，忌鐵，酒洗。 山藥 烘乾，酒洗。 山茱萸 酒洗，焙。

白茯苓 乳拌，蒸。 澤瀉 酒洗，焙。 牡丹皮 酒洗，焙。

遼五味 炒，牛乳。 肉桂 去皮，忌火，二兩。

右除地黃膏另入，餘共為細末，煉蜜為丸，如桐子大，每

服三錢。空心淡鹽湯送下。忌食蘿蔔。

腎水不足，虛陽僭上之症。若不滋腎水，以益其陰，則水

不升而火不降。神光失序。不能收藏。故黑暗時明。用七
味丸。加五味子。夫五味滋腎水。要藥也。津液既生。腎水
自壯。水足而神光內斂。何有失序之虞。得桂辛熱。能引
火歸源。其患必瘳。夫在君火。可以濕伏。可以直折。在相
火。推當從其性而伏之。肉桂性熱。與火同性。雜在下焦。
壯水藥中能引無根虛火。降而歸經。此方以類聚之義。
也。且肉桂之質。在中半以下。故其性專走腎經下部。此
本乎地者。親下之義也。又况相火寄於甲乙之間。肝膽
木旺。則真風動。而烈火焰明。古人謂北方不可瀉。瀉肝
即所以瀉腎。本草曰。木得桂而枯。乃伐肝之要藥也。經

白熱因熱用從治之妙法。正與從其性而伏之義相合。或者畏其熱而遺之。豈達造化升降之微乎。黃柏知母。治用火。僅可施於壯實者。暫用之。若虛火而誤用之。則腎因瀉而愈虛。虛則火愈熾矣。素問氣增而勝。及久用寒涼。反從火化。不問乎。

親正反斜症

親正如何。却是斜。陰陽虛實。生若元精衰敗。元陽損。不久百臨莫怨嗟。

此症謂物之正者而反。乃內之陰陽偏勝。神光欲散之候。陽勝陰者。因陰幸。暗煩急悸。頭風痰火。

氣傷之病。陰勝陽者。色慾哭泣。厚味。經產血傷之病。此內之立府。鬱遏有偏。而氣重於半邊。故發見之光亦偏而不正矣。治用培植其本。而伐其標。久而失治。內障成矣。宜服

補陽湯

治陽不勝其陰。乃陰勝陽虛。則九竅不通。令青白

經氣不得上通於目。故青白翳內阻也。當於太陰少陰經中。九泉之下。以益肝中陽氣。沖天上名。此乃先補其陽。後於足太陽太陰標中。瀉足厥陰肝經陰火。伏於陽中者。正治也。內經云。陰勝陽虛。則當先補其陽。後瀉其陰。此治法是也。每日清晨。以腹中宿食消盡。先服補陽湯。午後食遠。次服升陽瀉陰丸。臨睡再服連藥益陰丸。此三方合治前症。若天色變大寒大風。並過於勞後損。飲食不調。精神不足。或氣弱。俱不替服。候時氣和平。天氣如常。服之。益先補其陽。使陽氣上升。然後空竅通利。而眼目明矣。

炙甘草

羌活

獨活

人參

熟地黃

白朮

土炒

黃芪

製各兩

白茯苓

生薑黃

知母

炒各三錢

柴胡

去苗二兩

肉桂

錢一

白芍藥

陳皮

澤瀉

防風

當歸身

錢五

右為粗末。每服五錢。水二鍾。煎至八分。去滓。溫服。空心。

使藥力行盡。方許食。

連藥益陰丸

治陽勝陰者服

甘草梢

羌活

獨活

當歸身

酒洗

五味子

防風

黃芩

草決明

川黃蘗

知母

黃連

酒洗或拌蒸。各一兩。

石決明

燒存性。六錢。

右為細末。煉蜜為丸。如茶豆大。每服五十九。漸至百丸。

止臨卧清茶送下當以助陽湯多服少服此藥一則妨

飲食二則力大如升陽湯不可多服

升陽泄陰湯

一名升陽柴胡湯治陰勝陽者服

羌活

當歸身

獨活

甘草梢

白芍

熟地黃

各一

兩

人參

生地黃

酒洗

黃芪

精實子

酒蒸

白木

製各

白茯苓

防風

廣陳皮

知母

酒洗各三錢煎

柴胡

去帶

厚肉桂

去皮各一錢半

右剉劑或為粗末亦可每服五錢白水煎服另合一料

煉蜜為丸如桐子大食遠茶清送下每日五十丸與煎

藥合一服不可飽服如天氣熱甚加五味子三錢或半

兩天冬肉五錢。精實子五錢。

視定反動症

視定反動。水不足。火邪上轉。故如斯。莫教動極。神光墜。如悔當年不聽醫。

此症謂物之定者。反覺振而動也。乃氣分火邪之害。水不能救之。故陽邪虛火。上旋轉運。而振掉不定。光華欲墜。久則地豈亦動。內障即成。恣酒嗜燥。頭風痰火之人。陰虛血少者。屢有此患矣。宜服

鉤藤散

鉤藤散

陳皮

麥門冬

石菖蒲

家制花

人參

明天麻 防風 白茯苓 鹿茸 製半夏 甘草
右爲龍末。每服四錢。姜三片。白水煎服。

視物顛倒症

顛倒光華病最奇。頭風痰氣火爲之。陰陽反復。光華損。屋
宇如崩地若移。莫言眩運無他患。直待盲時悔失醫。

此症謂目視物皆振動而顛倒也。譬諸環舞後定。視則
物皆移動而倒植。蓋氣不正。陰陽反覆。真元損傷。陰精
虛弱。而陽邪上千。虛眩一運。掉有一年數發。有一月數
發者。若發而視物顛倒。神光墜矣。因其發時。別其因風。
因虛。因痰。因火而治之。若以風眩不爲慮。反斲喪而觸

激者內障之患終莫能逃矣宜服

羚羊角散

半夏

製七次

當歸身

川芎

白芷

防風

明天麻

枳殼

甘草

各半錢

茯神

羚羊角

連細末各一兩

右為粗末每服四錢。姜三片煎去滓服

視一為二症

視一為二神光渺。腎肝不足精華少。光焰欲落神暗耗。急急求醫休去禱。不逢妙手理真元。內障昏昏何日子。目赤痛若輕微火。退自然容易好。常時視二難醫。休道精光還得早。

此症謂目視一物而為二也。乃光華耗衰，偏損敗壞矣。病在膽腎。膽屬真一之精，不足而陽光失其主倚，故錯亂兩渺視為二。若目赤痛而視一為二者，乃火壅於絡，陰精不得升運，以滋神光，故反為陽邪錯亂神光而渺其視也。譬諸目病時見一燈火而為二三也，宜服

補肝散

治肝風內障。不痛不癢，眼見花翳。黃白黑赤，或一物二形，難辨。

車前子

黃芩

川羌活

細辛

黑玄參

各一兩

人參

白茯苓

各二兩

防風

羚羊角

三兩

右為細末，每服一錢五分，食後不飲調服。

千金磁珠丸

見二卷。主明目百歲可讀。細字書。常服大益。眼目接此方。磁石法水入腎。磁石法水入。

此方

卷之五

七

心而神馳專入脾胃。乃道家黃婆媒合要姤之理。倪
生釋之。爲費詞矣。或加沉香五錢并降水火尤佳。

古人於腎虛及種子方中。每用磁石。近代泥於金石之
說。多不知用。然磁石性能引鐵。則用之者。亦是假其引
肺金之氣入腎。使其子母相生。而水得金而清。則相火
不攻自去矣。嗚呼。醫之神妙。在於幽微。此言可與知者
道也。

中和養胃湯

見二卷

視赤如白症

視物易色。病原非一。要當依色辨。分爲虛實。輕與緩急。
此症謂視物却非本色也。因物有虛實。而視有色空中。

見色之症不同。曾諸觀太陽若水輪觀燈火反粉色視粉牆轉如紅如碧者看黃紙而如綠如藍等類。此內絡氣鬱立府不和之故。當視色而別之以知何臟腑乘侮之爲病也。宜服

復明湯

黃芪

蜜製

黃歸身

柴胡

連翹

甘草

炙

生地黃

各二錢半

黃蘗

三分

川芎

蒼朮

米泔洗

廣陳皮

各五分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓熱服忌酒濕麵辛熱

醬料等物

益氣聰明湯

見二卷

治飲食不節勞役形體脾胃不足得內障其目或赤或白翳膜物不能見此藥

能聽耳明目久服無內外障耳鳴耳聾之患又能令
入精神過倍元氣日益身輕體健手足便捷此藥治
老人腰已下沉重疼痛如神若其人上體重精神不
足兩足輕淨不知高下以此空心服之或沙加黃藥
輕浮自減若治倒睫拳毛

內

障皆全善云內障先患一目次第相引兩目俱損者

者目系也目系屬足厥陰足太陽手少陰三經此
三經臟腑中虛則邪乘虛入經中鬱結從目系入黑
睛內為障翳龍木論所謂腦脂流下作翳者即足太
陽之邪也所謂肝氣冲上成翳者即足厥陰之邪也
故治法以鍼言之則當取三經之腧穴如天柱風府
大街通天等穴是也其有手巧心審諦者能用鍼於
黑眼裏接其翳為効尤捷也以藥言之則當補中疎
通此三經之鬱結使邪不入目系而愈飲食不節
勞傷形體脾胃不足內障服病宜人參補胃湯益氣
聰明湯圓明內障升麻湯復明湯葉云右四方治目
不明皆氣虛而未脫故可與參耆補中散加連柏若
氣既脫則黃柏等藥不可施經云陽氣者順勢則

張耑絕目青不可以視耳閉不可以聽之類是其症也。○內障右眼小背青白翳大背亦微顯白翳眼痛瞳子散大上熱惡熱大便澀滯艱難小便如常遇熱煖處頭疼瞋脹能食口渴或天陰暗則昏此症可服滋陰地黃丸翳在大背加升麻葛根翳在小背加柴胡羌活。○東垣云肝木旺則火之勝無所畏懼而妄行也故脾胃先受之或痛目而生內障者脾衰血胃主血心主脈脈者血之府也或曰心注血又曰脈注血肝之疾開於目也治法宜地黃丸當歸湯之類是也。

瞳神散大症

瞳神散大爲何如只爲火熱薰蒸瞳悠悠鬱久精汁虧致使神光皆失散陰精腎氣兩衰虛相火邪行無管制好如雞鳴卵中黃精氣不足熱所傷熱勝陰虛元氣損至死冥冥不見光

此症專言瞳神散大而風輪反爲窄狹若過甚則一週如線也。乃熱邪鬱蒸風濕攻擊以致神膏遊走散壞若初起卽收可復緩則氣定膏損則不復收斂若未起內障顏色只散大者直收瞳神瞳神收而光自生矣散大而有內障起者於收瞳神藥內漸加內障藥治之如瞳神難收病旣急者以收瞳神爲先瞳神但得收復目卽有生意有何內障或藥或鍼庶無失收瞳神之悔若只攻內障不收瞳神瞳神愈散而內障不退緩而疑治不決者其症皆氣定而不能治終身疾矣大抵瞳神散大症有數種皆因頭風痛攻之害雖有傷寒瘧疾痰濕氣

怒憂思經產敗血等病。久鬱熱邪火症。致令肝腎中所
蘊精汁虧耗。不能滋養目中神膏。故精液散走。而光華
失。水中隱伏之火發矣。水不足不能制火。火愈勝。陰精
愈虧。致清純太和之元氣。總皆乖亂。精液隨之而走。是
故因頭風攻散者。最難收也。且傷寒瘧疾痰火等熱症。
炎燥上蒸。神膏漸壞。內障漸起。來遲而收亦易斂。若因
風攻。則內障來速。亦難收斂。而光亦損矣。宜服

羌活退翳丸

一名地黃丸。能治內障。右眼小。背青白翳大。
背微顯白翳。腦疼。腫子散大。大便澀。或時難

小便如常。遇天熱。煖處頭痛。睛脹。能食。口澀。
復兼天陰。則昏暗等症。亦可服。滋陰地黃丸。

熟地

八錢

生地

酒製

歸身

酒製

茺蔚子

黃蘗

酒製

丹參

各五錢

黑附子炮 寒水石 柴胡 知母鹽水 牡丹皮酒洗

真川芎酒洗 羌活各三錢 防已酒製二錢 白芍藥酒製兩三錢

右為細末煉蜜為丸如小豆大每服五六十丸空心白

滾湯送下如宿食未消候饑時服之忌言語隨後以食

壓之

東垣蘭室秘藏方去翳在大背加葛根升麻翳在小背

加柴胡羌活是也

瀉腎湯治因喜食辛辣多房之物過多以致

枸杞子二錢 生地黃酒洗 知母酒洗 麥門冬去心

山萸肉去白 歸尾各一錢 白茯苓八分

獨活八分

右劉劑白水二鍾煎至一鍾去滓熱服

調氣湯治因暴怒以致腫神散大者服此後兼服磁硃丸

白芍藥 陳皮 生地黃 黃蘗鹽水炒 香附子醋製

知母鹽水炒 當歸身各一錢 枳殼 白茯苓各八分 甘草五分

右劉劑白水二鍾煎至一鍾去滓熱服

按瞳神散大屬腎若腎水固則氣聚而不散不固則相

火熾盛而散大若神水初變淡綠淡白色者可治若純

綠純白色者終為廢疾矣

地黃丸見二卷○治血弱陰虛不能養心致火旺於陰分瞳子散大少陰為君火主無為不行其

令相火代之與心胞絡之脉出心系分三道少陰相火
 之體無形其用在其中矣火盛則能令母實乙木引旺
 是也其心之脉挾目系肝之脉連目系子足少陽之
 脉同出耳中至耳上角斜起終於目外小骨風熱之盛
 亦從此道來上攻頭目致偏頭痛悶若瞳子散大視物
 昏花血虛陰弱故也法當養血涼血益馬收火散火而
 除風熱
 則愈矣

每服白朮食後茶清送下日進二服大忌辛辣之物恐
 助火邪及食寒涼之物傷其元氣藥不上行也又一論
 云瞳子黑眼法於陰山食辛熱之物助火乘於胸中其
 睛故散睛散則視物大矣

東垣云凡心胞絡之脉出於心口而下行也與小
 腸為表裏瞳子散大者少陰火旺也肝之
 脉連目系心主火肝主木木火相生其火則宜
 言宜服宜涼大忌辛辣熱物

常知此理可也。以諸藥主散熱則助火。故不可食酸。主
收心氣。製木火也。諸苦瀉火熱。則益水也。尤忌食冷水。
大寒之物。因寒能損胃氣。胃氣不行。則元氣不充。元氣
不生。致胃氣下陷。膈中三焦之火。煎心火乘肺。上入
膈。灼肺。火主散。故肺子之散大者。以此大熱之物。直助
火邪。尤為不可食也。藥中去芩。子以味辛。主益肝。
是助火也。故去之。加黃芩。五錢。黃連。三錢。黃芩。瀉中焦
心火。黃芩瀉上焦肺火。以酒洗之。乃寒。因熱用也。亦不
可用。青葙子。恐助陽火也。更加五味子。三錢。以收瞳神
之散大也。且火之與氣。勢不兩立。故經云。壯火食氣。氣
食少火。少火生氣。壯火散氣。諸酸物能助元氣。孫真人
曰。五月常服五味子。助五臟氣。以補西方肺金。又經行
以酸補之。以辛瀉之。則辛瀉氣明矣。或曰。藥中有當歸。
其味亦辛甘。不去之何也。此一味辛甘者。以其和血之
聖藥也。況有甘味。又欲以為鄉導為
諸藥之使。故不去也。宜服熟地黃丸。

瞳神縮小症

瞳神縮小。精氣俱傷。元陽耗散。欲墜神光。莫使汝盡醫術。

無方

此症謂瞳神漸漸細小如簪脚甚則縮小如針也視尚有光早治少挽復故則難患者因恣色之故雖病目亦不思淫慾及勞傷氣血思竭心意肝腎二經俱傷元氣衰弱不能升運清汁以滋膽膽中三合之精有虧則輪汁亦乏故瞳神中之精亦日漸耗損甚則陷沒而貽為終身疾矣亦有頭風熱症癰腫蒸竄精液而細小者皆宜藥初早救不然悔之不及也宜服

清腎抑陽丸

治水虧而目壞其病神大陰虛小而又小精漸之至竟如芥子者能久服此丸則陽平陰

秘睡神細卜之慙自可反無慮耳

寒水石

細研

黃柏鹽水製

生地黄

知母

鹽水製

枸杞子

黃連

酒炒

白茯苓

各二兩

獨活

八錢

草決明

當歸酒洗

白芍藥

酒洗炒各一兩

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三錢空心滾白

湯送下又宜用

抑陽酒連散或還陰救苦湯或啗鼻碧雲散

以上見二卷

能遠怯近症

怯近症兮視遠明眼前視物反不清陰精虛損陽邪旺痰

火之人候久遠治之之法補腎清心

此症謂目能遠視而不能近視也蓋陰精不足陽光有

昏視者

遠之反

症

餘病於水者故光華發見散亂而不能收斂近視治之

止在心腎心腎平則水火既濟而陰陽和暢則遠近發用

各得其宜夫血之所由生者心也心火下濟而身為精液其輕清之血

上升在目為膏汁若心火下濟而身為精液其輕清之血

其慧注皆斷耗陰精而陽火盛火性炎而發見

陰精之水不能制伏則火性炎而發見於外而遠照不能

治火反觸激者內障之病也

地芝丸治目能視遠知其

天門冬法心生地黄四兩

右為末煉蜜為丸如桐子大每服百丸食後茶清送下

六味地黃丸

治目病因於水虧火旺陰虛之

此肝腎血虛

痼瘕結核或四肢發搐眼目運動或咳嗽吐血頭目眩
暈或咽喉燥痛口舌瘡裂或自汗便血稟賦不足肢體
疲弱解頰失音畏明下真手足痿軟腎痛肝痛早洩女
色精血虧耗五服癯損凡屬腎肝諸虛不足之症宜用
此以滋化源其

功不可盡述

白茯苓

乳蒸晒乾

丹皮

炒各兩半

澤瀉

微炒一兩

山藥

人乳蒸晒乾

山茱萸

去核酒蒸焙乾各二兩

熟地

四兩酒各半

煮爛搗膏另八

右其為細末煉蜜為丸如桐子大每服三錢空心淡鹽

湯送下或遺精加牡蠣燒紅水淬為末焙乾三兩忌雜

茹

腎者水臟也水衰則龍雷之火無畏而亢上故王啟玄

曰壯水之主以制陽光也。卽經所謂求其屬而衰之地。黃味厚爲陰中之陰。專主補腎填精。故以爲君。山茱萸味酸歸肝。乙癸同治之義。且腎主閉藏而酸斂之性。正與之宜也。山藥味甘歸脾。安水之仇。故用二味爲臣。厚皮亦入脾。其用主宣通。所以佐茱萸之澀也。茯苓亦入脾。其用主通利。所以佐山藥之滯也。且色白屬金。能培肺部。又有虛則補其母之義。至於澤瀉。瀉有三功。一曰利小便以泄相火。二曰行地黃之滯。引諸藥速達腎經。三曰有補有瀉。諸藥無畏惡增氣之虞。故用以爲使。此丸爲益腎之聖藥。而脉者。辨其功驗。乃用藥者有四失也。

一則地黃非懷慶則力淺一則地黃非自製則不勝且有犯鐵之弊一則疑地黃之滯而減少之則君主力弱一則惡澤瀉之慘而滅之則使力微自踣四失而各皆藥之無功毋乃寔乎

能近怯遠症

怯遠肝經血不足腎經光華只咫尺視物模糊精氣衰神光陽火早醫治

此症非謂稟受生成近視之病不治者蓋言平昔無病能遠視忽自患能近視而不能遠視者陽不足陰有餘病於火少者也無火是以光華不能發越於遠而拘斂

近視耳治在膽腎膽腎足則神膏厚神膏厚則經絡潤

澤經絡潤澤則神氣和暢而陽光盛矣夫氣之所用謂

之天在身為運用在目為神光若耽酒嗜燥頭風痰火

忿怒暴悖者必傷神損氣神氣弱必發用衰發用衰則

經絡澀滯故陰勝陽衰而光華不能及遠矣宜服

定志丸治目能近視知其有水不能遠視責其無火水宜

補心火并治心氣不定五臟不足恍惚振悸憂愁悲傷多夢善忘睡中驚寤恐怖不寧喜怒無時晝明暮

暮持肝腎陽虛並宜服之常服益心強志令人不服

定志丸去心 菖蒲各二兩 人參 白茯神各一兩

右為細末煉蜜為丸如桐子大以硃砂為衣每服三十丸米飲送下食後臨卧日進三服

補腎磁石丸

治肝腎氣虛血耗眼目昏睛遠視無明時見黑花漸成內障

石決明

火煨研碎

甘菊花

去梗葉

磁石

搗碎煨紅醋淬

肉蓯蓉

各四兩

鬼絲子

水淘淨酒浸一宿慢火烘乾一兩

右爲細末用雄雀十五隻去毛嘴足留肚腸以青鹽二兩水三升同煮至於極爛水欲盡爲度取出杆搗如泥和藥末爲丸如梧子大每服三錢空心溫酒送下

謹按陽氣者猶日火也陰氣者金水也先儒所謂金水內明而外暗日火內暗而外明者也然人之眼借臟腑五行精華相資而神明故能視物此理之常也難經曰目得血而能視殊不知氣者蓋血得氣爲水火之交而

能神明者也。否則陽虛不能視遠，陰虛不能視近，是爲老人桑榆之景。然學者大旨病能求諸此，則思過半矣。

神水將口症

神水將枯，禍不遲。更兼口燥，人知氣壅絡澀，多乾燥，莫待骨傷，出及珠。

此症目珠外神水枯澀，而不潤澤，最不易識。雖形於外，而不知其內，乃火鬱蒸於膏澤，故睛不清，而珠不瑩潤。汁將內竭，若有浮淚盈眶，亦可。然此症氣色乾澀，如蜃蜃垂涎之光，凡見此症，必有危。治之若緩，則神膏枯澀，神膏既枯，則瞳神危矣。昔人云：若有疳症，其

如鴨漚太人五十以外糞如羊屎而目患此症者皆列
若熱結膀胱之症神水消渴者因水枯結熱蒸燥不清
先治其源而流自清矣其症有二有陰虛症有陽虛症
不可混治陰虛以補腎丸治之陽虛以調中益氣湯療
之或曰既云神水枯澁而又謂陽虛者何也蓋神水即
氣中之精液陽不生則陰不長也宜服

滋腎丸

何云滋腎滋腎陰也。能治溺閉名通關丸
一名坎離丸。治神水枯結熱蒸燥不清。

黃蘗

鹽水製

知母

鹽水炒過
製各三兩

肉桂

三錢

右爲細末。水泛爲丸。如梧桐子大。每服百丸。空心沸湯
送下

按熱自足心直衝股內而入腹者謂之腎火起於湧泉之下知栢苦寒水之類也故能滋益腎水肉桂辛熱火之屬也故須假之反佐此易所謂水流濕火就燥聲應氣求之理也

東垣治王善夫精小便不通服之如神世醫用五苓散徒損真陰之氣師小便反秘結愈甚者非其治也

補腎丸

杜仲薑汁炒牛膝酒洗陳皮各二兩黃柏鹽水炒龜板酥製各四兩

兩五味子夏加一兩冬加五兩

右為細末煉蜜為丸每服三十九空心鹽湯

送下

按黃柏龜板杜仲牛膝皆濡潤降厚物也故能降而補
陰復用陳皮假以疏滯夏加五苓散者扶其不勝之金也
冬加乾薑者壯其無光之火也經曰無伐天和此之謂
爾。

調中益氣湯

治脾胃不調而氣弱目瞤兩目
緊澀不能瞻視乃元氣下陷

黃芪

錢

升麻

五分

陳皮

六分

木香

二分

人參

甘艸

蒼朮

泔水製

柴胡

各五分

右剉剉白水二鍾煎至八分去滓臨卧溫服。

按脾胃不調者腸鳴飧泄膨脹之類也氣弱者言語輕
微手足倦怠目瞤不明也補可以去弱故用人參黃芪

甘草甘溫之性能補則中氣不弱而目能視矣。蒼朮辛燥能平胃中敦阜之氣。升麻柴胡輕清能升胃家陷下之氣。木香陳皮辛香去胃中陳腐之氣。夫敦阜之氣平陷下之氣升。陳腐之氣去。寧有不調之中乎。

聚開障症

障生或聚開濕熱痰於腦。滯如雲月。遮間視星芒小。痛癢總無常。開聚時常遠。來時昏澀多。醫治須圖早。

此症謂目或圓或缺。痛則見之。不痛則隱。聚散不一。來去無時。或一月數發。或數月一發。乃腦有濕熱之故。痰火入患者多。久而不治加。有變症生矣。宜服

生熟地黃丸

治肝虛目暗膜入黑輪眼見黑花如豆累累

濕暗冷淚翳膜遮睛
內外障並治之

川牛膝

酒製

石斛

防風

各六兩

生地黃

熟地各一
斤

杏仁

泡去
皮尖

羌活

各四兩

白菊花

一兩

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服三十丸以黑豆三升炒令烟盡為度。滓好酒六升。每用半盞食前送下。或疾熱湯亦可。

聚花障症

聚花四圍起濕熱膜中停古利如銀齒不必拘其形生來

多不覺慢慢入風輪。燥暴並食酒勞。瞻竭視睛。損傷年日。久乾澀。每昏疼。圈圓。圈已極。始悔不能明。

此症甚薄而白。起於風輪週匝。從白膜之內。四圍環布而來也。凡性急及患痰。竭視勞瞻。耽酒嗜味。傷於濕熱之人。每罹此患。久則始有日急乾澀。昏花不爽之病。犯而不戒。甚則有腫神。細小內障等症。或因邪觸。激火入血。分淚流赤痛者。亦在變症之例。雖有斑花鋸齒之說。實無正形。凡見白圈傍青輪際。從白膜四圍圈圓而來。卽是此症。若白嫩在輪外。四圍生起。珠赤痛者。是花翳白陷。不可誤認爲此。宜服。

羚羊角飲子

羚羊角

銼末

防風

白茯苓

黃芩

酒炒

熟地黄

桔梗

枸杞子

人參

車前子

細辛

黑玄參

知母

各等分

右剉劑。白水二鍾煎至八分。去滓溫服。

圓翳障症

此翳薄而且圓。陰陽大小一般。當珠方是此症。精虛氣滯之過。若要除根去盡。必須得遇神仙。

此症色白而大小不等。厚薄不同。薄者最多。間有厚者。亦非堆積之厚。比薄的少厚耳。多有掩及瞳神。名曰遮。

睛障病最難治為光滑深沉之故有陰陽二症之別陽者明處看不覺鮮白若暗處看則明亮白大陰者暗處看則淺明處看則深大然雖有明暗驗病之別而治則一同故陰陽大小一服也病若久雖治亦不能免終身之患矣宜服

以青丸治其病最深

細辛 五味子

蔓荊

石決明煨各一兩

空青一錢 生地黄

知母

防風各二兩

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服三十丸空心茶清送下

羚羊角飲子 治不痛不癢

羚羊角 三兩 銹末

知母

人參

車前子

黃芩

各二兩

防風

二兩

右爲細末每服一錢五分。水一鍾煎至五分。食後去滓溫服。

水晶障翳

眼內障如水晶色厚而光滑且清白。瞳子隱隱內中藏視物蒙如雲霧隔。君子若要盡除根縱有良醫也無策。

此症色白清瑩但高厚而滿珠。看雖易治得効最遲。蓋根深氣結故也。初起膏傷時非比白混浮嫩之可治者。

識當別之庶無錯治之夫其名有四曰水晶曰玉翳浮
滿曰冰凍翳如冰凍之堅傍珠斜視曰透睛瞳內白翳
畧減而亦終身不痊之症也宜服

七寶丸 治內障冰翳如冰凍堅結睛上
先釗撮取之後以此藥散翳

石決明 二兩 研 琥珀 錢半 研 真珠 錢半 研 熊膽 五錢 研

茺蔚子 人參 各一兩 龍腦 二錢

若為細末煉蜜為丸如桐子大每服十五丸加三三
九食煎茶清送下

劍脊翳症

劍脊名儀翳其症有厚薄精膏有所優此症初應惡妙手

此症也應一半落

此症色白或如糙米色者或帶焦黃色者但狀如劍脊樣中間畧高兩邊薄些橫於風輪之外者卽此症也厚薄不等厚者雖露上下風輪而瞳神被掩視亦不見薄者雖不盡掩視方昏眊較之重者稍明耳縱然色嫩根浮而亦有疤迹若滑色深沉者雖有妙手堅心治療止可減半若微紅罩絆者尤爲難退以上不論厚薄非留心於歲月者難効也宜服

七寶湯

治內障橫翳橫著瞳人中走如劍脊缺後用藥

羚羊角

銼末

犀角

銼各

胡黃連

車前

石決明刷洗甘草炙各五錢明丹砂另研

右除丹砂石決明外麤搗爲末每服三錢半水一盞煎七分去滓入丹砂末三分石決明末一字再煎兩沸食後溫服。

魚鱗障症

魚鱗障症色昏白狀類魚鱗不長高雖有情囊神妙手也知不得盡除消。

此症翳雖白色而不光亮狀帶斜歪故號曰魚鱗乃氣結膏凝不能除絕。昔患此病初起誤認他症服藥不得相宜及點片腦眼藥凝結故耳宜服。

羚羊角散

羚羊角

銼細末

細辛

升麻

各二兩

甘草

炙

右爲細末。用一半煉蜜爲丸。如桐子大。存一半末。每日煎飲服丸。每服五十九。食後送下。

暴盲症

暴盲似祟最。蹠蹠慕地無光。總不知莫道鬼神來作孽。陰陽關格與神離。

此症謂目平素別無他症。外不傷於輪廓。內不損乎瞳神。倏然盲而不見也。其故有三。曰陰孤。曰陽寡。曰神離。乃閉塞關格之病。病於陽傷者。緣忿怒暴悖。恣酒嗜辛。

好燥。厥及久患熱病。痰火入得之。則頓燥秘渴。病於陰傷者。多色慾悲傷。思竭哭泣太頓之故。或因中寒中風之症起。傷於神者。因思慮太過。用心罔極。憂傷至甚。驚恐無措者。得之。則其人如癡如呆。病發之狀。屢有因頭風痰火元虛水少之人。眩暈發而盲瞽不見。能保養者。治之自愈。病後不能養者。成痼疾。其症最速。而思人以爲魘魅鬼神爲祟之類。混於祈禱。殊不知急治可復。緩則氣定而無用矣。宜服

味道遙飲

治怒氣傷肝。肝氣虛血少。致目暗不明。頭目澀痛。婦女經水不調等症。

當歸身

酒炒

白朮

土炒

白茯苓

甘草

煎生

白芍藥

酒炒

柴胡

各一炒梔子

丹皮

各分

右剉剉白水二鍾煎至八分去滓食遠服。

按經曰肝者將軍之官所主怒怒則肝傷氣逆氣逆則血亦逆故血少。眼者肝之竅又曰目得血而能視今肝傷血少故令目暗。越人云東方常實故肝藏有瀉而無補即使逆氣自傷疎之即所以補之也。此方名曰逍遙亦是疎散之意。柴胡能升所以達其逆也。芍藥能收所以損其過也。丹梔能瀉所以伐其實也。木盛則土衰白朮甘草扶其所不勝也。肝傷則血病當歸所以養其血也。木實則火燥茯苓所以寧其心也。

柴胡參朮湯

治怒傷元陰

人參 去蘆

白朮

黃芩

白芍

青皮

各一錢

五分

錢

甘草

八分

川芎

七錢

黃芩

二錢

青皮

四分

錢

柴胡

二分

右剉剉白水二鍾煎至八分去滓食遠服

肝主怒怒傷肝肝傷故目昏花視物不明怒傷

元陰血虛必矣故用芎黃以養榮怒傷元陽

氣虛必矣故用人參白朮以益衛青皮平肝柴胡

瀉肝

熊膽丸

治目忽然失

光翳膜障蔽

熊膽

川黃連

密蒙花

羌活各兩

蛇退

地骨皮

仙靈脾

木賊

脂草各一兩

旋覆花

甘菊花

瞿麥各五錢

藜仁三錢

麒麟竭

蔓菁子各二錢

右十五味。而熊膽為主。餘同為細末。以羯羊肝一具。煮其一半。焙乾。雜於藥中。取其一半生者去膜。搗爛。入上藥杵而為丸。如梧桐子大。飯後用米飲送下三十丸。諸藥修治無別法。惟木賊去節。藜仁去殼皮。取霜。蔓菁子并水淘。蛇皮炙之。

饒州郭端友精意事佛。偶染時病。忽患兩目失光。翳膜障蔽。忽夢皂衣人告曰。汝要眼明。可服熊膽丸。既

獨參湯

治元氣離脫
致目無所見

其藥多愈郭生自記其本末云
依方市藥。旬日乃成。服之二十餘日。藥盡復明。即自

人參數兩。清泔者佳。用銅刀切片。或銀鍋砂鍋煎湯
頻服。

血者氣之守。氣者血之衛。相偶而不相離者也。一或失
血過多。則氣為孤陽。亦幾於飛越矣。故令脉微欲絕。斯
時也有形之血不能速生。幾微之氣所宜急固。故用甘
溫之參以固元氣。所以權輕重於緩急之際也。故曰血
脫益氣。此陽生陰長之理也。

一人形質好飲熱酒忽目盲面暗此熱酒所傷胃氣
汚濁之死血使然以蘇木作物調人參未服一月鼻
及兩掌皆紫黑子日濯血行矣以四物湯加蘇
木桃仁紅花陳皮煎調人參連服數日而愈

青盲五

青盲兩種並難醫無如愚人竟不知最怕老年神氣弱又
嫌疲病血精虧本是神昏并瞻澀內膜外障及時醫雖然
服藥扶根本不若清修作主持若得神光精氣足自是還
明如舊時

此症謂目內外並無障翳氣色等病只自不見者是乃
玄府幽深之源鬱遏不得發此靈明耳其因有二一曰
神散二曰瞻澀須訊其為病之始若傷於七情則傷於

神若傷於精血則損於膽皆不易治而年老尤難若能
保其固本抱元守一者屢有不治而愈若年高及疲病
者或心腎精血損者雖治不愈世人但見目盲便呼為
青盲者謬甚夫青盲者瞳神不大不小無缺無損仔細
視之瞳神內並無些小別樣氣色儼然與好人一般只
是白看不見方為此症若少有氣色卽是內障非青盲
也宜服

鎮肝明目羊肝丸

雞羊肝

一具用新酒洗淨

切細片

蜜桂

柏子仁

活

白朮土炒

五味子

細辛各五錢 川黃連炒七錢

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服四十丸或空心食遠沸湯送下

復明丸

冬青子

生用一觔陳酒共甯并蒸元 蝸蝓活提七次晒七日露七夜焙乾 一個

夜明砂

酒洗黃炒 枸杞搗焙 熟地酒浸焙 張豆殼炒各一兩

川黃連

微炒 白木製各三錢 辰砂兩半用一半共煇

右為細末煉蜜為丸辰砂為衣如桐子大每服五十丸

食後熱酒送下

又方

治肝腎兩虛或因他病而弱清血初起者服之如神

兔絲子

洗酒黃炒

補腎脂

巴戟

枸杞

川牛膝

洗酒炒

肉蓯蓉

竹刀切片酒浸焙乾各一兩

青鹽

二錢另研

石為細末用猪腰子一個竹刀切開半邊去內筋膜入

藥末一錢將線縛緊用上好數年陳酒蘸濕炙熟冷定

火性食之即愈

本事方

治青言內障

白羯羊肝

只用羊肝一片薄切新瓦上焙

狸仁

去殼

兔絲子

車前子

防風

麥冬肉

地膚子

去殼

杏仁

炒

苦葶藶

羌活子

白芷

白茯苓

青箱子

五味子

枸杞

熟地

兩半

白爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服三四十九溫湯送下目進三服不拘時候

張臺卿嘗苦目暗京師醫者各炙肝俞遂轉不見物因得此方服目遂明一男子內障醫治無效因以餘劑遺之。又燈下語其家曰。此有所見如隔門縫見火者。及旦視之眼中翳膜俱裂如線張云此藥最勿妄與人。忽之則無驗于益信之。且欲廣其傳也。

高風障症

高風俗號是雞盲爲類。雞睛夜不明因損元陽真氣弱亦能致禍勿言輕能知變理不治自寧不知戒忌何止雙盲陰陽否塞爲中滿不久魂飛入北漠

此症俗呼爲雞盲。本科曰：高風障。至晚不明，至曉復明也。蓋元陽不足之病。或曰：旣陽不足，午後屬陰，何未申尙見子後屬陽，何止寅未明？曰：午後雖屬陰，日陽而時陰，陽分之陰。且太陽明麗於天，日亦陽類，故明。至酉日沒，陰極而暝。子後雖屬陽，夜陰而時陽，陰分之陽。大地晦黑於理，當暝。雖有燈月，而目不明者，病亦至甚。月太陰，燈亦屬陰，不能助內之陽。病輕者，視亦稍見。至寅時陽盛，日之陽升，故稍明。卯時日出而明如故者，人調養得宜，神氣融和，精血充足，而陽光盛，不治自愈。若不能保養，反致喪真，則有變爲青盲內障甚，則有陰陽乖亂。

而不塞開格爲中滿而死者食之以肝治之以補氣藥
卽愈益見其真元氣弱而陽不足也宜服

人參補胃湯

治勞役所傷飲食
不節內障昏瞶

蔓荊子

一錢二分

黃芪

蜜製

人參

各一錢

甘草

炙八分

白芍藥

炒

黃藥

酒炒各七分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓食遠溫服臨卧再服

能令目明視物如童時若兩脚踏地不知高下蓋冬天

多服升陽藥故也病減住服候五七日再服此藥春間

服乃時藥也

補中益氣湯

治兩目目腫緊澀不能瞻視乃元氣下陷並
治工作勞力讀書傷刻勤苦傷神饑飽失節

醫見錄

卷之五

四

此數者俱發目赤頭疼寒熱交作身強體痛若勞極復感風寒則頭疼如破全似外感傷寒之症誤用發表之藥鮮不傷人故東垣先生發

內外傷辨首用此方取濟甚衆
當歸身酒洗 白朮土炒 陳皮各錢半 人參二錢

炙甘草 升麻 柴胡各二錢 黃芪蜜製三錢

右剉劑白水二鍾薑一片棗三枚煎食後熱服

按中氣者脾胃之氣也五臟六腑百骸九竅皆受氣於脾胃而後治故曰土者萬物之母若饑困勞倦傷其脾胃則衆體無以滋氣而生故東垣諄諄以脾胃為言也是方人參黃芪甘草甘溫之品甘者中之味溫者中之氣氣味皆中故足以補中氣白朮甘而微燥故能健脾胃

當歸質潤辛溫故能澤生木以燥之歸以潤之則不剛
不柔而土氣和矣復用升麻柴胡升清陽之氣於地道
也。蓋天地之氣一升則萬物皆生。天地之氣一降則萬
物皆死。觀乎天地之升降而用升麻柴胡之意從可知
矣。或曰東垣謂脾胃一虛肺氣先絕故用黃芪以益皮
毛不令自汗而泄肺氣其辭切矣。予考古人之方而更
其論何也。余曰東垣以脾胃爲肺之母故耳。余以脾胃
爲衆體之母。凡五臟六腑百骸九竅莫不受其氣而賴
之。是發東垣之未發而廣其意耳。豈曰更論。

轉光丸

治肝虛雀
目青盲

生地黄

白茯苓

川芎

山藥

蔓荊子

白菊花

防風

細辛

熟地黄

各等分

右藥細末。煉蜜為丸。如桐子大。每服二十丸。空心桑白

皮湯送下。

還明散

治小兒每至夜

夜明砂

晚蓮花

櫻精草

蛤粉

右等分為末。煎黃蠟為丸。如桐子大。三歲一丸。猪肝一

片。切開置藥於內。麻皮。火炒。研。以酒煮。後食

之

決明夜翳散

見二卷

青風障症

青風內障肝膽病。精液虧兮氣不平。哭泣憂鬱風氣痰。幾般難使陽光靜。莫教綠色上瞳神。散失光華休怨命。

此症專言視瞳神內有氣色昏朦如青山籠淡烟也。然自視尙見。但比平時光華則昏朦日進。急宜治之。免變綠色。則病甚而光沒。陰虛血少之人及竭勞心思憂鬱。忿悲用意太過者。每有此患。然無頭風痰氣火攻者。則無此患病。至可畏危已甚矣。不知其危而不急救者。盲在反掌耳。宜服

羚羊角湯

治青風內障勢倦加昏重頭旋腦痛眼內痛澀者

人參

車前子

玄參

地骨皮

羌活

羚羊角

銑末各等分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓食後服

雙全善日諸方以羚羊角玄參細辛羌活防風車前子為君。羚羊角行厥陰經藥也。丹谿云。羚羊角入厥陰經。甚捷。是也。玄參色黑。行少陰經藥也。海藏云。玄參治空中氣。氣無根之失。為聖藥也。羌活防風車前子。行太陰經藥也。如筋脉枯澀者。諸方中更加夏枯草。能散結氣。有補養厥陰血脉之功。其草三月開花。逢夏即枯。蓋秉純陽之氣也。至哉斯言。故治厥陰。目痛如神。以陽治陰也。嘗試之。有驗。然此諸方。又當知劑之所在。若氣脫者。必與玄參膏相半服之。氣虛者。必與東垣補腎人參湯。益氣聰明湯之類。相半服之。血虛者。必與熟地黃丸之類。相兼服之。更能內觀靜守。不干塵勞。使陰氣平和。方許有効。

綠風障症

綠風內障其色綠重是青風輕是黃視物昏冥濃霧密頭眩風痰火氣傷瞳神若大害尤速稍失調治睛漸黃目病若到如此際看看漸失本來光。

此症專言瞳神氣色濁而不清其色如黃雲之籠翠岫似藍靨之合藤黃乃青風最重之症久則變爲黃風雖曰頭風所致亦由痰濕所攻火鬱憂思忿怒之故若傷寒痰熱蒸先散瞳神而後綠後黃前後並無頭痛者乃痰濕攻傷其氣神膏耗涸是以色變也然雖如是蓋久鬱則熱勝熱勝則肝之風邪起矣故瞳神愈散愈黃。

大凡病到緣風極為危者十有九不能治也宜服

半夏羚羊角散治痰濕攻傷緣風內障

羚羊角錢細末 薄荷 羌活 半夏錢各半

白芷 川烏炮 川芎 防風

車前子錢各五 細辛二錢

右為末每服三錢生薑三片水二鍾煎一鍾去滓服或

荆芥湯調下

羚羊角散治緣風內障頭眩目痛眼內痛澀者服如

羚羊角錢細末 防風 知母 人參

黑玄參 茯苓 黃芩 桔梗

車前子各四兩 細辛二兩

右為礞末每服三錢白水煎食後溫服。

烏風障症

烏風內障濁如烟氣散膏傷膽腎間真元既耗精已耗盡
藥妙藥也徒然

此症色昏濁氣滯如暮雨空中濃烟重霧風痰之人
嗜慾太多及敗血傷精腎絡損而脂汗枯精氣耗而神
光墜矣宜服

白附子湯

治發散初起黑
花昏昏內障

荊芥穗

防風

白菊花

甘草炙

白附子炮

蒼朮

木賊草

羌活

白茯苓

去刺人參各等分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓食後服

涼膈丸

龍膽草

酒炒黃連酒炒防風

柴胡

地膚子

黃芩酒炒蘆薈

黃柏鹽水製

荆芥穗各等分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三錢清茶送下

僵仆障症

僵仆障睛正最惡風輪上際微微薄慢慢下墮來似此人

難覺。脂有濕熱。逆肝絡。逆肺刺。其待如月。圓昏昏難摸。捉此症。乃風輪上生。變氣輪之際。從白膜內。隱隱白片。薄薄。盡向下來。其色粉青。乃非內非外。從膜中而來者。初起不覺。而無慮。後漸結久。始下風輪。而損光。或沿邊風輪。迴匝而為。斑花為害。最遲。人不為慮。每中其患。乃腦漏。或腦有風濕。久積。結微火。攻擊。腦油。滴下。好酒暴怒。積滯。生變。為變亦急。凡經水。沈頭不待乾。而濕熱着及。痰火。人好煉。厥濕熱物者。皆有此患。宜服

補肝散

羚羊角

細辛

羌活

白茯苓

內服丸散

楮實子 人參 玄參 車前子

夏枯草 防風 石斛各等分

石為細末每服一錢食後米飲調下

墜翳丸治翳月內障起微有頭旋痛

青羊膽 鯉膽 狗膽各七 熊膽二錢

石決明治遠視存甘另研細一兩 牛膽五錢 麝香少許

右為細末麵糊為丸如桐子大每服十九空心茶清送下

如銀障症

如銀內障分輕重輕則中間一點糊重則瞳神皆白亮瞳

中佛鬱氣相干憂傷其氣並思慮色慾勞精竭視瞻帶淫
清純生障氣精華冥冥過三光也須憂養休傷變一撥光
開勝遇仙

此症專言障神中之白色內障也輕則一點白亮或如
銀星一片重則障神皆雪白而圓亮圓亮者一名圓翳
內障有仰月像月變重爲圓者有一點從中起視漸昏
漸變大而不見者乃鬱氣傷其冲和清純之元氣故陽
光精華爲其閉塞而不得發見亦有濕熱在腦腦脂滴
萌而元精損鬱閉其光非若銀白內障已散大而不可
收者乃可治之兆年未過六旬血氣稍盛者治之皆可

復明宜服

石決明散

石決明醋煨

防風

人參

羌活子

車前子

細辛

減半

知母

白茯苓

遠五味

玄參

黃芩

各等分

石為細末每服二錢食前茶清調下

瞳神欹側症

欹側瞳神其故當辨外若不傷內必有損損外不妨損內更慌莫使損盡終是無光。

此症專官瞳神歪斜不正或如杏仁

乃腎膽之神膏所損。瞳神將盡矣。若風輪破損。神膏流
沒。致瞳神欲倒者。輪外必有蟹睛在焉。蟹睛出而瞳神
不得復圓。外亦有脂翳。終身不脫。若輪外別無形証。而
瞳神欲倒者。必因內傷。腎水肝血。膽汁化源。故膏液自
耗。而瞳神欲沒。甚為可畏。急治之。雖難復圓。亦可挽住
而免墜盡喪明之患。宜服

生犀角丸 治五行應變氣血兩虛。榮衛凝滯。以致肝腎凝受風邪。瞳神歪斜內障。

石決明 性微寒 當歸身 犀角 銼末 麻黃 減半

楮實子 枸杞子 防風 各等分

右為細末。麴糊為丸。如桐子大。每服五十九丸。茶清送下。

瞳神返背症

瞳神返背者少醫治須當要心巧不逢妙撥轉將來定是昏冥直到老。

此症因六氣偏勝風熱搏擊其珠斜視到轉白向外而黑向內也藥不能療止用撥治須久久精熟者識其何因何症或帶上帶下之分然後撥之則療在反掌否則患者徒受痛楚醫者在費心機今人但見目內障或目損風水二輪而背維環白障患者皆呼爲瞳神反背謬妄之甚夫反背實爲斜視烏珠向內也非是珠端正而向外者今亂呼爲瞳神反背必其人亦是盲目豈能治

人之音

內障根源歌

不疼不痛漸昏朦。薄霧輕烟漸漸濃。或見花飛蠅亂出。或如絲絮在虛空。此般狀樣因何得。肝臟停留熱氣風。大目大睛驚和恐。腦脂流入黑睛中。初時一眼先昏暗。次第相牽兩目同。苦口何須陳逆耳。只緣肝氣不相通。彼時服藥宜銷去。將息若乖卽沒功。日久既應全黑暗。因名內障障雙瞳。名字隨形分十六。龍木禪師早推功。靈藥千般難得効。金針一撥日當空。戒慎將息依前說。如違法則枉費工。

針內障眼法歌

內障出來十六般學醫濟世要細看。分明一一知形狀。施針方可得相安。若或針法不精靈。悞損神光取患難。冷熱須明虛與實。調和四體待全康。不然氣悶違將息。嘔逆勞神弱。却翻咳嗽震驚皆不可。多驚先服鎮心丸。若求良藥。引刃等。用意臨時仔細看。老醫細針初復嫩。針形不可似一般。病虛新產懷娠月。下針總知消息難。不雨不風兼晴月。清齋三日在針前。安心定意行針道。念佛觀經莫雜喧。患者向明盤膝坐。提撕腰帶得身心。但行醫哲路。則隱之心光復還。有血莫驚須在手。再開看忽然驚。振臂重治服藥三旬日。朗然。

三月花開水

勸莫與言還睛丸散堅心服百日分明復舊光

針內障後法歌

內障金針針了時。醫師言語要深思。綿包黑葷如球子。眼
上安排日係之。卧眠頭枕須安穩。仰卧三朝莫厭遲。封後
忽然微有痛。腦風牽動其他疑。或針或烙依經治。痛極仍
將火熨之。擬吐白梅含咽。汁吐來仰卧却從伊。起則恐因
遭勞損。雖然稀少也須知。七朝厚粥溫溫食。震動牙關事
不宜。大小便時須緩緩。無令驟起與扶持。高聲叫喚言多
語。驚動睛輪見雪飛。如此志心三十日。漸行出入認。知
清心莫憶陰陽事。夫婦分牀兩日期。一月不須臨牀。

度濕首痛微微五腥酒麴週年隣服藥消除病本基

鎮心丸 治心痛驚悸憂思愁慮傷心惕然心跳動振不安吐舌而赤且眩等症

牛黃一錢 另研 生地酒洗 當歸身酒洗 遠志肉去核神各

錢金箔十五片 石菖蒲九箇 川黃連各二錢半 辰砂另研

右以前六味共為細末後入牛黃辰砂二末猪心血為

丸如黍米大金箔為衣每服五六十丸煮猪心湯送下

附太玄真人進還晴丸表

伏以醫有聖神工巧之妙人不可不知藥有溫涼寒熱之

性醫不可不辨昔黃帝專百藥而著本草叔和察六脉

而燭病原所以扶世道救民命者良有在也上古之

人咸際壽考。况世之最貴者。莫貴於人。人之最貴者。莫貴於目。夫目者。五臟六腑之精華。百骸九竅之至寶。洞觀萬物。朗視四方。皎潔如珠。包含天地。內連肝膽。外應睛瞳。竅雖開於肝門。而乃屬於腎臟。腎屬北方壬癸水。心屬南方丙丁火。心腎不和。水火交戰。則血氣停留不散。膽振肝虛。定然眼中受病。凡療眼疾。須補腎元。次修肝木。肝乃腎之苗。腎乃肝之本。修肝則神魂安靜。補腎則精魄安和。精魄既得安和。眼目自然明朗。譬如種木。當在修根。根壯則枝葉茂盛。根損則花葉凋零。且如黑睛。屬腎虛。則眼淚下流。鑲門通肝風。則冷淚常出。

白睛屬肺肺熱則赤脈繫白輪上下臉屬脾脾風則拳
毛倒睫大小背屬心心熱則鑿睛努肉眼有五輪外應
五行木火土金水白睛五臟肝心脾肺腎五輪者風血
肉筋水八脈者太陽少火厥雷山澤目有病患須究根
源勿用庸醫妄行醫治夫人好於丹藥脾胃損傷終夜
憂思精神耗憊或胎中受熱或胎上受寒或食五辛太
多或縱七情過甚或淫慾望月或近火衝爛故使三焦
受熱致令兩目失明或風多淚或視物如烟或觀空
中如雲霧或視太陽如日或五臟虛耗夜夢鬼交眼前
時見黑花遠視黑輪常如白霧昏朦臣病機之

陛下戒之。今按本草製成仙方。能養性安神。撲風明目。却
熱除邪。修肝補腎。雖連年內障。而可明治。近日赤腫。而
卽去藥。共二十九味。名曰還睛丸。修之奇異。有君臣佐
使之功。製不等。常有蒸炮剉煉之妙。不問老幼。陰陽卽
見光明。清白恭惟。

皇帝陛下。修凝道。總攝養精神。端居九重之中。明
之萬里之外。固不賴於此藥。亦可保於未然。伏願普頒。百姓請
將試之。俯賜羣臣。必臻捷効。臣無任瞻。

天仰

聖渥切誠。虔之至謹。錄其方。隨表拜。

進以

聞

還睛丸

治遠年近日一切目疾內外翳障攀睛努肉爛弦風眼及年老虛弱目昏多淚迎風冷淚及視物昏

花人成內障此藥最能降虛火并胃水若久服之良能讀細字

人參

杏仁

抱去

肉蓯蓉

焙乾

杜仲

酒洗

牛膝

酒洗

石斛

枸杞子

各一兩

犀角

生薑

防風

各八錢

菊花

去梗

葉兔絲子

酒煮

地黃

酒洗

黃藥

酒洗

炒

青箱子

根

白朮

乳蒸

茯苓

去心

麥門冬

去心

羊角

細

未草決明

山

天

去心

乾

麥門冬

去心

羊角

細

生地

酒洗

川

酒洗

黃藥

酒洗

五味子

焙乾

羊角

細

甘草炒各知母酒炒

右除犀角末另人餘爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服四五十丸空心鹽湯送下一方內無當歸肉蓯蓉杜仲黃柏知母亦名固本還睛丸

金銀辨義

古人云金銀者貴之也金爲五金之總名銅鐵銀錫皆是也本草云馬啣鐵無毒可作鍼以馬屬午屬火火地金能解鐵毒故用以作鍼

煮鍼法

煮鍼一法素問原無今世用之欲溫而澤也是法有益


而無害故從之

危氏書用烏頭巴豆各一兩硫黃麻黃各五錢木燐子
烏梅各十個將鍼入水於砂鍋內或確內煮一日取出
再以砂確內用沒藥乳香當歸花蕊石各五錢又如前
水煮一日取出用皂角水洗再於大肉內煮一日仍用
丸屑打磨淨端直松子油塗之常近人氣爲妙

金鍼式

金鍼柄以紫檀花梨木或犀角爲之長二寸八九分如已
絃粗兩頭鑽眼深三四分用上好赤金子抽粗絲長一

封眼法



預收芙蓉半老綠葉晒乾爲末用井花涼水調勻以絹紙剪圓塊如茶鍾口大先將敷藥敷眼上眉稜骨及下眶以紙一層封貼藥上又上藥一層蓋紙一層封定候將乾以筆蘸水潤之日夜敷次夏月倍之一日一換仰面而臥若將針眼向下就枕防脂脂從上復下也起坐飲

食大小二便俱立緩不可用力震動三日內只用溫和
湯粥調熟餽饌不可震動牙齒三日後開封視物服藥
漸養而已

後若目疼痛急取生艾或乾艾同生葱各半共搗銅鍋
內炒熟布包熨太陽穴三五次即止○若瞳神有油氣
不清當平肝氣用枳櫚枳殼柴胡之類○作嘔吐用藿
香淡豆豉薑製厚朴半夏之類○火旺體厚者宜清火
順氣消痰用黃連枳殼枳櫚半夏麥冬瓜蒌之類○若
弱者用茯神熟地枸杞麥冬車仁貝母白朮制絲五
子白芍當歸之類○針後忌用川芎熟行氣作痛

陽頭疼。用防風。白芷。羌活。石膏之類。痛甚。用炒鹽熨之。
○若白睛赤。用柴胡。紅花。赤芍。歸尾。梔仁。桑皮。防風之
類。○瞳神微散。用白芍。五味子。麥冬。茯神。人參。蒼朮。酸
棗仁之類。○受熱致瞳。神細小者。用寒水石。當歸。黃連。
黃芩。羌活。子。柴胡。炒梔仁之類。○若障復障。宜服平肝
之劑。其障自退。如不速退。復再針撥亦可。

以上以

人參

當歸

乳香

沒藥

連翹

川山甲

白芷

各等分

酒製白朮

二鍾煎至八分。去滓。食遠服。

前

卷之五

五

此病乃濕熱鬱積蒸燂脂膜下垂故珠內有膜遮
之如猶如有膜懸於明窓之內外人雖見其窓
明而窗內有膜障其則不明也但今人以訛傳訛
反背其理謂已失一時難以正之當知此
病非金針入珠內以去脂膜時刻能明此論惟可與
知者難與俗人言此病辨之以爲後人垂鑒
有能本論金針開內障之法謹按其法初患眼內障之
時其膜不痛不澀不癢不旋不痛而翳膜已結成
必俟歲月障老始宜金針去其翳如撥雲見日而
明也今具其法於後

開內障圖

圓翳

初患時見圓翳花發垂障漸甚輕烟先患一膜夾
其相連但圓翳如油點野冰中陽看則外映看則

大金針一
換即去

滑翳

翳如水晶珠
宜金針聚之

澀翳

翳如凝脂色
宜金針撥之

浮翳

翳黑睛之深處細看
方見宜金針預之

橫翳

橫如劍脊兩邊薄中央厚宜針於中央厚處撥之
以上五翳皆先患一日則後俱損初患之時其眼

痛淚流旋類痛難宜針撥先須服藥獨假月翳東

冰翳

初患時頭眩類痛有頭旋額痛只宜針輕撥之
先患一目向後踴如冰凍屋白宜於所經過脈針
其胸穴忌出血宜

針緊數不宜強撥

偃月翳 初患時微微赤腫痛先患一日失第相率

聚花翳 初患時微有頭旋眼淚自中時時痰痛先患

兼於所過之經針灸其膈

散翳 如雲點生翳

黑水翳 定翳凝結青色宜針撥之

鰐鰓翳 頭睛被打築惡血津入眼內至二三十年成翳

撥之

雖不痛不癢其翳黃色紅色者不宜針撥翳破散者不

宜針撥中心濃重者不宜針撥撥之不動者曰死翳點

隱獨白翳黃心宜先服藥後針之若無翳者名曰風赤

不宜針之

白睛黃心

若過睛穴後用金針輕輕擦或先扣一日向

後慎

烏風

焦翳但瞳人小三五年內結成翳青白色

肝風

無翳眼前多見虛花或白或黑或赤或黃或

五風

初患時頭旋兩眼同患急宜補治勿忌房事

綠風

初患時頭旋額角偏痛連眼臉眉及鼻頤骨痛眼

黑

庶

黑風

初患時頭旋額痛連眼臉市如竹痛眼

青風

初患時微有痛連頭旋腦痛先患

雷頭風初患時頭旋惡心嘔吐先患一目次第相牽俱發為積神或大或小便凝脂結白

用針忌日見本

推逐日按時尻神所在當忌凡用針次錄

子時在踝丑時在頭寅時在耳

卯時在面辰時在頭巳時在乳

午時在脚未時在腹申時在心

酉時在背戌時在腰亥時在臍